- (2): 45.
- [11] 张瑾钰, 陈一强, 孔晋亮, 等. 绿原酸、异绿原酸对烟曲霉生物膜抑制作用的体外研究[J]. 中国感染与化疗杂志, 2014, 14(4): 327-333.
- [12] Cao Y, Dai B, Wang Y, et al. *In vitro* activity of baicalein against *Candida albicans* biofilms[J]. *Int J Antimicrob Agents*, 2008, 32(1): 73-77.
- [13] Singh B N, Upreti D K, Singh B R, et al. Quercetin sensitizes fluconazole-resistant *Candida albicans* to induce apoptotic cell death by modulating quorum sensing [J]. *Antimicrob Agents Chemother*, 2015, 59(4): 2153-2168.
- [14] Shevelev A B, La Porta N, Isakova E P, et al. *In vivo* antimicrobial and wound-healing activity of resveratrol, dihydroquercetin, and dihydromyricetin against *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, and *Candida albicans* [J]. *Pathogens*, 2020, 9(4): 296.
- [15] Mishra S, Singh S, Misra K. Restraining pathogenicity in *Candida albicans* by taxifolin as an inhibitor of Ras1-pka pathway[J]. *Mycopathologia*, 2017, 182(11-12): 953-965.
- [16] da Silva C R, de Andrade Neto J B, de Sousa Campos R, et al. Synergistic effect of the flavonoid catechin, quercetin, or epigallocatechin gallate with fluconazole induces apoptosis in *Candida tropicalis* resistant to fluconazole[J]. *Antimicrob Agents Chemother*, 2014, 58(3): 1468-1478.
- [17] Dominguez E, Zarnowski R, Sanchez H, et al. Conservation and divergence in the *Candida Species* biofilm matrix mannan-glucan complex structure, function, and genetic control [J]. *mBio*, 2018, 9(2): e00451-e00418.
- [18] Dabiri S, Shams-Ghahfarokhi M, Razzaghi-Abyaneh M. Comparative analysis of proteinase, phospholipase, hydrophobicity and biofilm forming ability in *Candida* species isolated from clinical specimens[J]. *J Mycol Med*, 2018, 28(3): 437-442.
- [19] Pristov K E, Ghannoum M A. Resistance of *Candida* to azoles and echinocandins worldwide [J]. *Clin Microbiol Infect*, 2019, 25(7): 792-798.
- [20] Tits J, Cammue B P A, Thevissen K. Combination therapy to treat fungal biofilm-based infections [J]. *Int J Mol Sci*, 2020, 21(22): 8873.

原花青素抗 UVB 诱导皮肤成纤维细胞凋亡和氧化损伤的影响

饶美荣, 曾芬, 钟咪, 张佳音
(江南大学附属医院皮肤科, 江苏 无锡 214000)

摘要: 目的 研究原花青素对中波紫外线 (UVB) 诱导皮肤成纤维细胞凋亡和氧化损伤的影响。方法 分离培养人皮肤成纤维细胞, 分成对照组 (不做处理), UVB 组 (UVB 照射), 原花青素低、中、高剂量组 (20、40、80 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 原花青素处理, UVB 照射), 原花青素中剂量+XAV939 组 (40 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 原花青素+1 $\mu\text{mol}/\text{L}$ XAV939 处理, UVB 照射)。CCK-8 实验检测细胞增殖能力, 流式细胞术检测细胞凋亡能力, 黄嘌呤氧化法检测细胞 SOD 活性, 硫代巴比妥酸法检测 MDA 水平, 比色法检测 GSH-Px 活性, ELISA 法检测培养液上清 MMP-1、MMP-9 水平, Western blot 法检测 Bax、Bcl-2、Wnt1、 β -catenin 蛋白表达。结果 与对照组比较, UVB 组细胞存活率, SOD、GSH-Px 活性, Bcl-2、Wnt1、 β -catenin 蛋白表达降低 ($P<0.05$), 凋亡率, Bax 蛋白表达, MDA、MMP-1、MMP-9 水平升高 ($P<0.05$); 与 UVB 组比较, 原花青素各剂量组细胞上述指标均有改善 ($P<0.05$), 并呈剂量依赖性; XAV939 则逆转了原花青素对 UVB 诱导皮肤成纤维细胞的保护作用 ($P<0.05$)。结论 原花青素通过激活 Wnt/ β -catenin 信号通路抑制 UVB 诱导皮肤成纤维细胞凋亡和氧化损伤。

关键词: 原花青素; 中波紫外线 (UVB); 皮肤成纤维细胞; 凋亡; 氧化损伤; Wnt/ β -catenin 信号通路

中图分类号: R285.5

文献标志码: B

文章编号: 1001-1528(2022)12-4044-06

doi: 10.3969/j.issn.1001-1528.2022.12.053

皮肤是人体和外界环境直接接触的器官, 经过紫外线照射后皮肤组织会出现光老化现象^[1]。中波紫外线 (UVB) 能够穿过表皮损伤真皮, 是自然界中导致皮肤光损伤以及光老化的重要原因, 皮肤成纤维细胞是其主要的靶细胞^[2]。皮肤经过紫外线照射后能够引起氧化损伤, 诱导细胞凋亡, 进而造成皮肤损伤, 促进皮肤光老化^[3]。原

花青素是一种缩合单宁, 在各类中药的皮、核、种子中存在, 具有抗炎、抗过敏、抗氧化等功效, 对肿瘤和心血管系统疾病有治疗功效^[4]。原花青素含有数个酚性羟基, 其在机体内被氧化产生氢离子, 这些氢离子与自由基或氧化物结合, 从而避免脂质发生氧化, 改善氧化损伤^[5]。原花青素能够改善长波紫外线诱导的皮肤成纤维细胞降解细胞

收稿日期: 2021-07-10

作者简介: 饶美荣 (1982—), 女, 硕士, 从事中西医结合治疗皮肤科疾病的研究。E-mail: kln237@163.com

外基质程度,延缓皮肤光老化,从而保护皮肤组织^[6]。Wnt/ β -catenin 信号通路是目前发现的与皮肤损伤有关的信号转导通路,其在UVB处理的皮肤成纤维细胞中被抑制,而激活Wnt/ β -catenin能改善皮肤损伤^[7-8]。本实验探讨原花青素对UVB引起的皮肤成纤维细胞凋亡和氧化损伤的作用机制,以期为其治疗皮肤光老化的临床应用提供理论基础。

1 材料

1.1 细胞 人皮肤成纤维细胞的获取源自江南附属医院2019年9月青少年男子行环切术得到的包皮组织,研究经医院伦理委员会审核批准(LS2019055)。

1.2 试剂与药物 原花青素(货号Y-033,纯度>98%)购自成都瑞芬思生物科技有限公司。谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px)检测试剂盒(货号A005-1-2)、 β -连环蛋白(β -catenin)抗体(货号KF682)购自南京建成生物工程研究所;辣根过氧化物酶标记的二抗(货号7074)、Bcl-2相关X蛋白(Bax)抗体(货号14796)购自美国Cell Signaling Technology公司;基质金属蛋白酶-1(MMP-1)检测试剂盒(货号JL10180-48T)购自北京百奥莱博科技有限公司;超氧化物歧化酶(SOD)检测试剂盒(货号S0086)、丙二醛(MDA)检测试剂盒(货号S0131S)、B细胞淋巴瘤/白血病-2(Bcl-2)抗体(货号AB112)购自上海碧云天生物技术有限公司;Wnt1抗体(货号A-AO1303a)购自美国Abgent公司;基质金属蛋白酶-9(MMP-9)检测试剂盒(货号USCN00694)购自上海北诺生物科技有限公司;甘油醛-3-磷酸脱氢酶(GAPDH)抗体(货号ab263962)购自英国Abcam公司;Wnt/ β -catenin信号抑制剂XAV939(货号S1180)购自美国Sigma公司。

2 方法

2.1 人皮肤成纤维细胞分离培养 参考文献[9]报道,取包皮组织剪碎,浸泡于碘伏中5 min,用含有青链霉素的生理盐水洗涤3次,加入0.5% Dispase酶,37℃消化4 h,分离真皮、表皮组织。将真皮组织用磷酸缓冲盐溶液(PBS)洗涤2次,加入含有10%胎牛血清的DMEM,于37℃、5%CO₂培养箱中培养过夜,更换细胞培养液后继续培养,细胞融合成片后进行传代(0.25%胰蛋白酶),期间每隔3 d更换新鲜细胞培养液,收集第3~6代细胞用于后续实验。分离培养的细胞经免疫组化染色Vimentin阳性,鉴定为皮肤成纤维细胞。

2.2 CCK-8实验检测细胞活力 将人皮肤成纤维细胞以 2×10^4 /mL的密度接种到96孔板中,每孔100 μ L,细胞贴壁后分别加入含有0、20、40、80、160、320 μ g/mL原花青素细胞培养液,培养24 h, PBS洗涤细胞,加入100 μ L细胞培养液和10 μ L CCK-8溶液,继续培养4 h,于450 nm波长处检测光密度(OD)值,计算细胞存活率。

2.3 分组与给药 将人皮肤成纤维细胞分为对照组,UVB组,原花青素低、中、高剂量组,对照组细胞不做任何处理;UVB组细胞经UVB照射;原花青素各剂量组细胞分别在UVB照射前24 h用20、40、80 μ g/mL原花青素预处理,

照射结束后再用20、40、80 μ g/mL原花青素处理24 h。各组细胞处理24 h后,按“2.2”项下方法检测细胞存活率变化。UVB照射方法为发射峰值313 nm,照射剂量30 mJ/cm²。

2.4 流式细胞术检测细胞凋亡率 各组细胞处理24 h后,弃掉培养液上清, PBS洗涤3次,加入300 μ L Binding Buffer悬浮细胞,加入5 μ L膜联蛋白V-FITC溶液于室温下避光结合15 min,加入5 μ L碘化丙啶于室温下结合15 min,再加入200 μ L Binding Buffer混匀,用流式细胞仪检测各组细胞凋亡情况,计算总凋亡率,公式为总凋亡率=晚期凋亡率(右上象限)+早期凋亡率(右下象限)。

2.5 检测细胞SOD、GSH-Px活性和MDA水平 收集各组细胞,严格按照相关试剂盒说明书检测细胞SOD、GSH-Px活性和MDA水平。

2.6 ELISA法检测细胞MMP-1、MMP-9水平 收集细胞培养液上清,严格按照相关试剂盒说明书检测上清中MMP-1、MMP-9水平。

2.7 Western blot法检测细胞Bax、Bcl-2、Wnt1、 β -catenin蛋白表达 收集各组细胞,加入含有PMSF的RIPA溶液提取细胞总蛋白,BCA法检测蛋白总浓度,加入等体积2 $\times$ Loading Buffer后于100℃煮沸5 min,蛋白样品放入-80℃保存备用。取30 μ g蛋白样品上样电泳,再将蛋白转移到NC膜上,NC膜放入5%脱脂奶粉溶液中室温结合2 h,加入Bax(1:1 000)、Bcl-2(1:1 000)、Wnt1(1:800)、 β -catenin(1:800)抗体溶液,4℃孵育过夜,加入二抗溶液(1:2 000),室温孵育2 h,采用ECL法显色,通过Image J软件分析条带灰度值,以GAPDH为内参,计算目的蛋白的相对表达。

2.8 检测Wnt/ β -catenin信号通路抑制剂对原花青素调控UVB诱导皮肤成纤维细胞凋亡、氧化损伤的作用 将人皮肤成纤维细胞在UVB照射前24 h用40 μ g/mL原花青素和1 μ mol/L Wnt/ β -catenin信号抑制剂XAV939处理,经UVB照射后,继续用两药处理24 h,记为原花青素中剂量+XAV939组,按“2.2”项下方法检测细胞活力,“2.4”项下方法检测细胞凋亡率,“2.5”项下方法检测细胞SOD、GSH-Px活性和MDA水平,“2.6”项下方法检测细胞培养液上清MMP-1、MMP-9水平,“2.7”项下方法检测Bax、Bcl-2、Wnt1、 β -catenin蛋白表达。

2.9 统计学分析 通过SPSS 21.0软件进行处理,计量资料以($\bar{x} \pm s$)表示,组间比较采用t检验,多组间比较采用单因素方差分析。 $P < 0.05$ 表示差异具有统计学意义。

3 结果

3.1 原花青素对人皮肤成纤维细胞增殖的影响 与0 μ g/mL原花青素组比较,20、40、80 μ g/mL原花青素组人皮肤成纤维细胞存活率没有明显变化($P > 0.05$),160、320 μ g/mL原花青素组人皮肤成纤维细胞存活率降低($P < 0.05$),见表1。因此,选择20、40、80 μ g/mL原花青素进行后续实验。

表 1 原花青素对人皮肤成纤维细胞存活率的影响 ($\bar{x}\pm s$, $n=9$)

原花青素/($\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$)	存活率/%
0	100.00 $\pm$ 10.36
20	97.34 $\pm$ 10.17
40	95.25 $\pm$ 8.49
80	93.81 $\pm$ 11.72
160	83.22 $\pm$ 7.12*
320	62.34 $\pm$ 4.78*

注: 与 0 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 原花青素组比较, * $P<0.05$ 。

图 1 各组细胞凋亡情况

图 2 各组细胞 Bax、Bcl-2 蛋白条带图

表 2 原花青素对 UVB 诱导人皮肤成纤维细胞增殖及凋亡的影响 ($\bar{x}\pm s$, $n=9$)

组别	存活率/%	总凋亡率/%	Bax	Bcl-2
对照组	100.00 $\pm$ 8.62	7.45 $\pm$ 0.63	0.43 $\pm$ 0.06	0.85 $\pm$ 0.08
UVB 组	63.20 $\pm$ 6.33*	28.26 $\pm$ 2.15*	0.98 $\pm$ 0.09*	0.26 $\pm$ 0.03*
原花青素低剂量组	73.25 $\pm$ 3.26 ^{&}	20.11 $\pm$ 2.08 ^{&}	0.77 $\pm$ 0.06 ^{&}	0.38 $\pm$ 0.04 ^{&}
原花青素中剂量组	86.90 $\pm$ 5.54 ^{&#}	15.02 $\pm$ 1.21 ^{&#}	0.63 $\pm$ 0.06 ^{&#}	0.56 $\pm$ 0.05 ^{&#}
原花青素高剂量组	95.27 $\pm$ 4.17 ^{&#△}	10.65 $\pm$ 1.16 ^{&#△}	0.51 $\pm$ 0.04 ^{&#△}	0.67 $\pm$ 0.04 ^{&#△}

注: 与对照组比较, * $P<0.05$; 与 UVB 组比较, [&] $P<0.05$; 与原花青素低剂量组比较, [#] $P<0.05$; 与原花青素中剂量组比较, [△] $P<0.05$ 。

细胞 MMP-1、MMP-9 水平升高 ($P<0.05$); 与 UVB 组比较, 原花青素各剂量组人皮肤成纤维细胞 MMP-1、MMP-9 水平降低 ($P<0.05$), 见表 4。提示原花青素可抑制 UVB 诱导的皮肤成纤维细胞分泌 MMP-1、MMP-9。

3.5 原花青素对 UVB 诱导人皮肤成纤维细胞 Wnt1、 β -

3.2 原花青素对 UVB 诱导人皮肤成纤维细胞增殖及凋亡的影响 与对照组比较, UVB 组人皮肤成纤维细胞存活率、Bcl-2 蛋白表达降低 ($P<0.05$), 细胞凋亡率、Bax 蛋白表达升高 ($P<0.05$); 与 UVB 组比较, 原花青素各剂量组人皮肤成纤维细胞存活率、Bcl-2 蛋白表达升高 ($P<0.05$), 细胞凋亡率、Bax 蛋白表达降低 ($P<0.05$), 并呈剂量依赖性, 见图 1~2、表 2。提示原花青素可抑制 UVB 诱导皮肤成纤维细胞凋亡。

3.3 原花青素对 UVB 诱导人皮肤成纤维细胞氧化损伤的影响 与对照组比较, UVB 组人皮肤成纤维细胞 SOD、GSH-Px 活性降低 ($P<0.05$), MDA 水平升高 ($P<0.05$); 与 UVB 组比较, 原花青素各剂量组人皮肤成纤维细胞中 SOD、GSH-Px 活性升高 ($P<0.05$), MDA 水平降低 ($P<0.05$), 并呈剂量依赖性, 见表 3。提示原花青素可抑制 UVB 诱导的皮肤成纤维细胞氧化损伤。

3.4 原花青素对 UVB 诱导人皮肤成纤维细胞 MMP-1、MMP-9 水平的影响

与对照组比较, UVB 组人皮肤成纤维细胞 Wnt1、 β -catenin 蛋白表达降低 ($P<0.05$); 与 UVB 组比较, 原花青素各剂量组人皮肤成纤维细胞 Wnt1、 β -catenin 蛋白表达升高 ($P<0.05$), 见图 3、表 5。提示原花青素能促进 UVB 诱导的皮肤成纤维细胞中 Wnt/ β -catenin 信号通路激活。

表 3 原花青素对 UVB 诱导人皮肤成纤维细胞氧化损伤的影响 ($\bar{x}\pm s, n=9$)

组别	SOD/ (U·mL ⁻¹)	MDA/ (μmol·L ⁻¹)	GSH-Px/ (U·mL ⁻¹)
对照组	23.45±1.25	2.90±0.25	5.56±0.47
UVB 组	7.49±0.46 [*]	8.79±0.41 [*]	1.20±0.11 [*]
原花青素低剂量组	12.32±1.42 ^{&}	7.15±0.52 ^{&}	2.86±0.14 ^{&}
原花青素中剂量组	17.91±1.89 ^{&#}	5.26±0.43 ^{&#}	3.55±0.35 ^{&#}
原花青素高剂量组	21.05±2.01 ^{&#△}	3.20±0.21 ^{&#△}	4.68±0.44 ^{&#△}

注：与对照组比较，^{*}*P*<0.05；与 UVB 组比较，[&]*P*<0.05；与原花青素低剂量组比较，[#]*P*<0.05；与原花青素中剂量组比较，[△]*P*<0.05。

表 4 原花青素对 UVB 诱导人皮肤成纤维细胞 MMP-1、MMP-9 水平的影响 (ng/mL, $\bar{x}\pm s, n=9$)

组别	MMP-1	MMP-9
对照组	14.26±1.42	9.58±0.74
UVB 组	68.53±4.36 [*]	43.28±4.16 [*]
原花青素低剂量组	52.01±4.17 ^{&}	35.26±2.17 ^{&}
原花青素中剂量组	30.66±2.89 ^{&#}	22.85±1.69 ^{&#}
原花青素高剂量组	20.17±2.15 ^{&#△}	14.56±1.18 ^{&#△}

注：与对照组比较，^{*}*P*<0.05；与 UVB 组比较，[&]*P*<0.05；与原花青素低剂量组比较，[#]*P*<0.05；与原花青素中剂量组比较，[△]*P*<0.05。

3.6 XAV939 对原花青素调控 UVB 诱导皮肤成纤维细胞增殖、凋亡、氧化损伤的影响 与原花青素中剂量组比较，原花青素中剂量+XAV939 组人皮肤成纤维细胞存活率，

图 4 各组细胞凋亡 (A) 和 Bax、Bcl-2、Wnt1、β-catenin 蛋白表达 (B) 情况

表 6 XAV939 和原花青素对 UVB 诱导人皮肤成纤维细胞增殖、凋亡、氧化损伤的影响 ($\bar{x}\pm s, n=9$)

组别	存活率/%	总凋亡率/%	SOD/(U·mL ⁻¹)	MDA/(μmol·L ⁻¹)	GSH-Px/(U·mL ⁻¹)	MMP-1/(ng·mL ⁻¹)	MMP-9/(ng·mL ⁻¹)
原花青素中剂量组	100.00±11.25	14.26±1.15	18.52±1.66	5.18±0.44	3.51±0.29	31.84±3.62	21.45±1.69
原花青素中剂量+XAV939 组	73.26±5.17 [*]	20.47±1.63 [*]	9.23±0.58 [*]	7.46±0.52 [*]	1.87±0.14 [*]	57.48±5.29 [*]	38.76±2.27 [*]

注：与原花青素中剂量组比较，^{*}*P*<0.05。

表 7 XAV939 和原花青素对 UVB 诱导人皮肤成纤维细胞 Bax、Bcl-2、Wnt1、β-catenin 蛋白表达的影响 ($\bar{x}\pm s, n=9$)

组别	Bax	Bcl-2	Wnt1	β-catenin
原花青素中剂量组	0.60±0.05	0.58±0.06	0.44±0.05	0.46±0.04
原花青素中剂量+XAV939 组	0.85±0.08 [*]	0.32±0.04 [*]	0.21±0.04 [*]	0.16±0.02 [*]

注：与原花青素中剂量组比较，^{*}*P*<0.05。

图 3 各组细胞 Wnt1、β-catenin 蛋白条带图

表 5 原花青素对 UVB 诱导人皮肤成纤维细胞 Wnt1、β-catenin 蛋白表达的影响 ($\bar{x}\pm s, n=9$)

组别	Wnt1	β-catenin
对照组	0.67±0.08	0.65±0.04
UVB 组	0.20±0.03 [*]	0.18±0.02 [*]
原花青素低剂量组	0.34±0.05 ^{&}	0.32±0.02 ^{&}
原花青素中剂量组	0.43±0.04 ^{&#}	0.45±0.06 ^{&#}
原花青素高剂量组	0.56±0.05 ^{&#△}	0.57±0.04 ^{&#△}

注：与对照组比较，^{*}*P*<0.05；与 UVB 组比较，[&]*P*<0.05；与原花青素低剂量组比较，[#]*P*<0.05；与原花青素中剂量组比较，[△]*P*<0.05。

Bcl-2、Wnt1、β-catenin 蛋白表达，SOD、GSH-Px 活性降低 (*P*<0.05)，细胞凋亡率，Bax 蛋白表达，MDA、MMP-1、MMP-9 水平升高 (*P*<0.05)，见图 4、表 6~7。

4 讨论

紫外线有3个波段,其中UVB能够穿过皮肤表皮,而皮肤成纤维细胞是真皮的主要组成部分,也是紫外线辐射造成光老化的靶细胞^[10]。紫外线照射后,皮肤成纤维细胞中抗氧化酶活性降低,导致细胞中的氧自由基积累,不仅造成细胞氧化损伤,还可以刺激细胞内凋亡相关蛋白,激活细胞凋亡途径^[11]。MDA是脂质过氧化产物,其水平升高标志着细胞氧化损伤程度增加^[12]。SOD、GSH-Px是重要的抗氧化酶,其活性降低则加快了氧化损伤进程^[13]。Bcl-2蛋白家族是与细胞凋亡密切相关的调控因子,其中Bax属于促凋亡蛋白,Bcl-2属于抗凋亡蛋白^[14]。人体真皮组织是由多种胶原酶、基质溶解素、明胶酶等组成的,而在皮肤光老化过程中,皮肤成纤维细胞能够分泌大量外基质降解酶如MMP-1、MMP-9将细胞外基质降解,造成皮肤组织破坏,引起皱纹和皮肤松弛^[15]。本实验结果发现,UVB刺激后的人皮肤成纤维细胞活性,SOD、GSH-Px活性,Bcl-2蛋白表达降低,细胞凋亡率,Bax蛋白表达,MDA、MMP-1、MMP-9水平升高,提示UVB诱导皮肤成纤维细胞氧化损伤和细胞凋亡,促进细胞外基质降解,造成光老化,UVB诱导皮肤成纤维细胞损伤模型构建成功。

原花青素对肿瘤、高血压、关节炎等有治疗作用^[16]。研究发现,原花青素能够改善皮肤损伤,其治疗后小鼠光老化皮肤组织细胞凋亡水平降低,抗氧化酶活性升高^[17];还可以改善紫外线诱导的人角质形成细胞增殖活性,发挥皮肤保护作用^[18];亦可抑制长波紫外线诱导的人皮肤成纤维细胞外基质降解,延缓皮肤光老化^[6]。本实验结果表明,原花青素能抑制UVB诱导人皮肤成纤维细胞凋亡、氧化损伤和分泌细胞外基质降解酶,具有改善皮肤成纤维细胞光老化的作用。

Wnt/ β -catenin是一个与细胞衰老有关的信号转导通路,Wnt1、 β -catenin是Wnt/ β -catenin信号通路的关键蛋白,两者表达改变与该信号通路的激活水平有关^[19-21],衰老的细胞中 β -catenin表达降低^[22-23]。在UVB诱导人皮肤成纤维细胞光老化模型中Wnt/ β -catenin信号被抑制,而激活Wnt/ β -catenin信号能够改善皮肤老化^[7-8]。本实验结果表明,原花青素能促进UVB诱导人皮肤成纤维细胞Wnt1、 β -catenin蛋白表达。当以Wnt/ β -catenin信号通路抑制剂和原花青素处理UVB诱导的人皮肤成纤维细胞时,发现Wnt/ β -catenin信号通路抑制剂可以逆转原花青素对UVB诱导的人皮肤成纤维细胞增殖、凋亡、氧化损伤作用,说明原花青素通过激活Wnt/ β -catenin信号调控UVB诱导的人皮肤成纤维细胞凋亡、氧化应激和分泌细胞外基质降解酶。

综上所述,原花青素对UVB诱导的皮肤光老化具有保护作用,能抑制UVB诱导的人皮肤成纤维细胞凋亡和氧化损伤,其机制与激活Wnt/ β -catenin信号通路有关,这为原花青素治疗皮肤光老化的临床应用提供理论支撑。

参考文献:

[1] Huang J, Tu T, Wang W B, et al. Asiatic acid glucosamine
4048

salt alleviates ultraviolet B-induced photoaging of human dermal fibroblasts and nude mouse skin [J]. *Photochem Photobiol*, 2020, 96(1): 124-138.

[2] Gao W, Wang Y S, Qu Z Y, et al. *Orobanche cernua* loeffling attenuates ultraviolet B-mediated photoaging in human dermal fibroblasts [J]. *Photochem Photobiol*, 2018, 94(4): 733-743.

[3] Liu X Y, Hwang E, Park B, et al. Ginsenoside C-Mx isolated from notoginseng stem-leaf ginsenosides attenuates ultraviolet B-mediated photoaging in human dermal fibroblasts [J]. *Photochem Photobiol*, 2018, 94(5): 1040-1048.

[4] 扶晓菲, 鄢明辉, 游春苹. 原花青素生理功能及其与肠道微生物相互作用的研究进展[J]. *食品工业科技*, 2020, 41(10): 350-357.

[5] 步文磊, 王茵. 原花青素的生物活性及作用机制研究进展[J]. *国外医学(卫生学分册)*, 2007, 34(5): 311-315.

[6] 康元, 张峻岭, 史先花, 等. 葡萄籽提取物原花青素对长波紫外线诱导皮肤成纤维细胞表达TGF- β II与Smad7的影响[J]. *中国中西医结合皮肤性病学期刊*, 2015, 14(6): 341-343.

[7] 熊正国, 彭慧巧, 张长城, 等. WNT/ β -catenin信号通路在皮肤衰老中作用的研究进展[J]. *山东医药*, 2016, 56(29): 105-107.

[8] 张杰, 甘华, 刘瑾. UVB诱导人皮肤成纤维细胞改变后 β -catenin基因表达水平的研究[J]. *西部医学*, 2019, 31(1): 47-50.

[9] Pan C W, Lang H X, Zhang T, et al. Conditioned medium derived from human amniotic stem cells delays H₂O₂-induced premature senescence in human dermal fibroblasts[J]. *Int J Mol Med*, 2019, 44(5): 1629-1640.

[10] Lee S E, Kwon T R, Kim J H, et al. Anti-photoaging and anti-oxidative activities of natural killer cell conditioned medium following UV-B irradiation of human dermal fibroblasts and a reconstructed skin model[J]. *Int J Mol Med*, 2019, 44(5): 1641-1652.

[11] Liu Y, Hwang E, Ngo H T T, et al. Protective effects of *Euphrasia officinalis* extract against ultraviolet B-induced photoaging in normal human dermal fibroblasts[J]. *Int J Mol Sci*, 2018, 19(11): 3327-3335.

[12] Ata N, Kulhan N G, Kulhan M, et al. The effect of resveratrol on oxidative ovary-damage induced by methotrexate in rats (resveratrol oxidative ovary-damage) [J]. *Gen Physiol Biophys*, 2019, 38(6): 519-524.

[13] Li W, Zhao S, Cheng F, et al. Oxidative damage and mitochondrial injuries differ following pneumoperitoneum pressure in rabbit models of varying degrees of hydronephrosis [J]. *Mol Med Rep*, 2018, 17(5): 6819-6827.

[14] Li Y Y, Lin Y K, Huang X X, et al. SCM-198 protects endometrial stromal cells from oxidative damage through Bax/Bcl-2 and ERK signaling pathways[J]. *Acta Biochim Biophys Sin (Shanghai)*, 2019, 51(6): 580-587.

[15] Kumar J P, Mandal B B. Inhibitory role of silk cocoon extract

- against elastase, hyaluronidase and UV radiation-induced matrix metalloproteinase expression in human dermal fibroblasts and keratinocytes[J]. *Photochem Photobiol Sci*, 2019, 18(5): 1259-1274.
- [16] 高晨曦, 黄 艳, 孙威江. 茶叶中原花青素研究进展[J]. *茶叶科学*, 2020, 40(4): 441-453.
- [17] 马嘉艺, 郭 砚, 冶 娟, 等. 黑果枸杞原花青素对小鼠皮肤衰老模型的保护作用研究[J]. *中国全科医学*, 2019, 22(15): 1851-1854.
- [18] 史先花, 张峻岭, 康 元. 葡萄籽原花青素及UVA照射对HaCaT细胞增殖活性的影响[J]. *中国中西医结合皮肤性病学杂志*, 2016, 15(3): 136-138.
- [19] Dzobo K, Thomford N E, Senthebane D A. Targeting the versatile Wnt/ β -catenin pathway in cancer biology and therapeutics: from concept to actionable strategy[J]. *OMICS*, 2019, 23(11): 517-538.
- [20] Kasoha M, Derneksi C, Seibold A, et al. Crosstalk of estrogen receptors and Wnt/ β -catenin signaling in endometrial cancer [J]. *J Cancer Res Clin Oncol*, 2020, 146(2): 315-327.
- [21] Tomar V S, Patil V, Somasundaram K. Temozolomide induces activation of Wnt/ β -catenin signaling in glioma cells via PI3K/Akt pathway: implications in glioma therapy [J]. *Cell Biol Toxicol*, 2020, 36(3): 273-278.
- [22] Dong F F, Dong S H, Liang Y, et al. miR-20b inhibits the senescence of human umbilical vein endothelial cells through regulating the Wnt/ β -catenin pathway via the TXNIP/NLRP3 axis[J]. *Int J Mol Med*, 2020, 45(3): 847-857.
- [23] Li Z L, Chen S F, Chen S, et al. Moderate activation of Wnt/ β -catenin signaling promotes the survival of rat nucleus pulposus cells via regulating apoptosis, autophagy, and senescence [J]. *J Cell Biochem*, 2019, 120(8): 12519-12533.

基于 ROS/TXNIP/NLRP3 通路探讨槲皮素对 Pg-LPS 诱导 RAW264.7 细胞炎症因子表达的影响

刘兰宁, 唐焕珍, 李晓媛

(南方医科大学中西医结合医院口腔科, 广东 广州 510315)

摘要:目的 探讨槲皮素调控活性氧(ROS)/硫氧还蛋白结合蛋白(TXNIP)/NOD样受体相关蛋白3(NLRP3)信号通路对牙龈卟啉单胞菌脂多糖(Pg-LPS)诱导RAW264.7细胞炎症因子的影响。**方法** 采用1 mg/L Pg-LPS刺激RAW264.7巨噬细胞构建细胞炎症模型,分为对照组、模型组及槲皮素低、中、高剂量组(5、25、50 μ mol/L),MTT法检测细胞活力,倒置显微镜观察各组细胞形态变化,RT-qPCR法检测炎症因子白细胞介素(IL)-6、IL-1 β 、TNF- α 、诱导型NO合酶(iNOS)、环氧合酶(COX-2)mRNA表达,荧光分光光度计检测细胞中ROS水平,Western blot法检测TXNIP、NLRP3蛋白表达。**结果** 0~50 μ mol/L槲皮素对RAW264.7细胞活力无明显影响($P>0.05$)。与对照组比较,模型组细胞形成伪足所占比例升高($P<0.05$),IL-6、IL-1 β 、TNF- α 、iNOS、COX-2 mRNA及TXNIP、NLRP3蛋白表达上调($P<0.05$),ROS水平增加($P<0.05$);与模型组比较,槲皮素各剂量组细胞形成伪足所占比例降低($P<0.05$),IL-6、IL-1 β 、TNF- α 、iNOS、COX-2 mRNA及TXNIP、NLRP3蛋白表达下调($P<0.05$),ROS水平减少($P<0.05$),并呈剂量依赖性。**结论** 槲皮素可抑制Pg-LPS诱导的RAW264.7细胞炎症因子表达,其机制可能与抑制ROS/TXNIP/NLRP3信号通路活性有关。

关键词: 槲皮素; 牙龈卟啉单胞菌脂多糖(Pg-LPS); ROS/TXNIP/NLRP3通路; 炎症因子

中图分类号: R285.5

文献标志码: B

文章编号: 1001-1528(2022)12-4049-04

doi: 10.3969/j.issn.1001-1528.2022.12.054

牙周炎是一种慢性、多因素的炎症性疾病,可能会导致牙齿脱落,并最终引发全身炎症反应^[1]。牙龈卟啉单胞菌(*Porphyromonas gingivalis*, Pg)定植在龈下部位并分泌毒力因子脂多糖(LPS),随后宿主产生炎症和免疫反应,这是牙周炎产生的主要病因之一^[2]。RAW264.7是小鼠单核巨噬细胞白血病细胞,是许多炎症因子的主要来源,在

牙周炎的发展中起着重要作用^[3]。近年来,基于炎症信号通路中关键分子筛选抗炎药物受到广泛关注,其中活性氧(ROS)/硫氧还蛋白结合蛋白(TXNIP)/NOD样受体相关蛋白3(NLRP3)信号通路作为炎症反应的重要信号通路之一^[4],已被报道在调节脊髓损伤神经炎症中发挥着重要的促进作用^[5]。提示ROS/TXNIP/NLRP3通路

收稿日期: 2021-09-22

作者简介: 刘兰宁(1975—),男,硕士,主治医师,从事口腔全科研究。Tel: 13538756796, E-mail: njyy441@163.com